

Dialyse hemodialyse: emtricitabine+tenofovir (TAF)+overig

6909

HD = hemodialyse, TAF = tenofoviraal fenamide

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Descovy (emtricitabine + TAF) 21 april 2016.	0	Emtricitabine kan worden verwijderd door middel van hemodialyse, waarbij ongeveer 30% van de dosis emtricitabine verwijderd wordt gedurende een dialyse van 3 uur, wanneer deze binnen 1,5 uur na toediening van emtricitabine start. Tenofovir wordt efficiënt verwijderd door middel van hemodialyse met een extractiecoëfficiënt van ongeveer 54%.	
-SPC Genvoya (emtricitabine + TAF + elvitegravir + cobicistat) 19 november 2015. -SPC Odefsey (emtricitabine + TAF + rilpivirine) 21 juni 2016. - SPC Symtuza (emtricitabine + TAF + darunavir + cobicistat) 21 september 2017. - SPC Biktarvy (emtricitabine + TAF + bictegravir) 22-6-2018	0	Niet gebruiken/niet aanbevolen bij Clcr < 30 ml/min vanwege beperkte/ontbrekende gegevens. Elvitegravir, cobicistat, rilpivirine en darunavir hebben een hoge eiwitbinding en zullen waarschijnlijk niet significant worden verwijderd door HD.	

Overig	Opmerkingen
-	

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Ja	24 oktober 2017

