

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Immucothel intradermaal/subcutaan/intra vesicaal	immunocyanine + immunosuppressiva	specifieke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen zijn niet waargenomen. De immuun stimulerende werking kan echter worden belemmerd door immunosuppressieve radio- of chemotherapie resp. door toediening van corticosteroiden. Voor een optimale therapie dient men niet gelijktijdig immunosuppressief te behandelen (bestraling, cytostatica, corticosteroiden). CI: Immunosuppressie.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties Oncologische middelen: voor deze interactie is weinig literatuur te vinden, maar is (farmaco)logisch. Niet combineren.

Imiquimod (induceert een lokale immuunrespons) niet koppelen, hierbij wil je geen signaal. Medisch-oncoloog: je moet imiquimod toch wel geven, ook al gebruikt de patiënt al immunosuppressiva. De meeste patiënten gebruiken al systemische corticosteroiden, daarbij is in de praktijk geen verminderd effect van imiquimod gezien.

Stockley: niet genoemd.

PubMed: zoeken op 'immucothecel' of 'keyhole limpet hemocyanin' levert geen ia-hits.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Ja	7 februari 2018