

Dextromethorfan + Rolapitant

M6390

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC + EPAR Varuby	dextromethorfan + rolapitant	toename blootstelling dextromethorfan 3x, 7 dagen na toevoegen eenmalige dosis rolapitant oraal.	1A

Overig	Stof	Effect
SPC + EPAR Varuby	dextromethorfan + rolapitant	clinical relevance of this increase is questionable. This is far lower than the effect of cinacalcet, a well-known strong CYP2D6 inhibitor, on dextromethorphan exposure, the latter increasing about 11-fold in extensive metabolisers.
	CYP2D6-substr + rolapitant	Rolapitant is een matige CYP2D6-remmer. Voorzichtigheid geboden bij combinatie met geneesmiddel dat door CYP2D6 wordt gemetaboliseerd, vooral met geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte.
Yu J. Drug Metab Dispos 2017;45:86-108.	dextromethorfan + rolapitant	dextromethorfan + rolapitant: dextromethorfan AUC ratio 3.3 en Cmax ratio 2.8. Dextromethorfan eenmalig 30 mg, rolapitant eenmalig 200 mg. Artikel met interactiedata van FDA.

Opmerkingen

Stockley: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Nee	7 februari 2018