

# Fexofenadine + Telotristat ethyl

# M6868

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Xermelo	fexofenadine + telotristat ethyl	<p>fexofenadine: Cmax en AUC ↑1.16x            Regime: dag 1 en 10 fexofenadine 180 mg 1-malig dag 1-5 telotristat ethyl 500 mg 3dd (2x aanbevolen dosering) gedurende 5 dagen, 24 gezonde vrijwilligers.            WFG: effect ↑1.16x valt binnen de ruis.</p> <p>Fexofenadine is substraat van P-gp en van MRP2; gebaseerd op de waargenomen kleine toename zijn klinische belangrijke interacties met substraten van P-gp en MRP2 onwaarschijnlijk.</p> <p>In vitro remt telotristat ethyl P-gp, maar zijn actieve metaboliet remt P-gp niet bij klinisch relevante concentraties.            Telotristat ethyl remt MRP2-gemedieerd transport (98% remming).</p>
SPC Telfast	fexofenadine	wordt (vrijwel) niet gemetaboliseerd. geen info mbt transporters
<a href="http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm#transporter">www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm#transporter</a>	fexofenadine	FDA Transporters: fexo is 'clinical' substraat voor P-gp en OATP1B.

## Opmerkingen

Stockley: -

PubMed: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	9 oktober 2018