

# Ataluren + Rifampicine

**M6893**

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC/EPAR Translarna  <a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02409004">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02409004</a>	ataluren + rifampicine	↓blootstelling ataluren met 29% (relevantie niet bekend) Regime: ataluren 1375 mg op dag 1 en 11, rifampicine 300 mg 2dd op dag 3-12; 15 vrijwilligers  Ataluren is in vitro substraat voor UGT1A9, rifampicine induceert UGT1A9	3A

Overig	Stof	Effect
SPC/EPAR Translarna	ataluren + UGT1A9-inductoren	voorzichtigheid is geboden bij inductoren van UGT1A9 (bijv. rifampicine).  No dose response studies were performed.

## Opmerkingen

WFG: vermijd de combinatie. Het betreft een nieuwe stof voor een zeldzame aandoening, waarbij verlies van effect moet worden voorkomen. En de dosering is heel specifiek, dus kennelijk goed uitgezocht. Bovendien een nogal duur geneesmiddel.

PubMed search augustus 2018: geen gegevens.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	11 december 2018