

Bariatrische chirurgie: prasugrel

7054

RYGB = Roux-en-Y gastric bypass, PPI = protonpompremmer

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg en chirurgie	Effect	Opmerkingen
-				

Overig

Brochure Geneesmiddelengebruik na bariatrische chirurgie. Nederlandse Obesitaskliniek, 2017.			Auteurs: Bij het gebruik van clopidogrel of prasugrel is een protonpompremmer niet nodig.
SPC Efient, rev. 14, 24-05-2017		Contra-indicaties: "Actieve pathologische bloedingen." Waarschuwing: "Daarom dient gebruik van Efient bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico alleen te worden overwogen wanneer de voordelen met betrekking tot de preventie van ischemische complicaties zwaarwegender worden geacht dan het risico op ernstige bloedingen. Dit punt van zorg geldt in het bijzonder voor patiënten: met bloedingsneiging (bv. als gevolg van een recent trauma, recente operatie, recente of recidiverende gastro-intestinale bloeding of actief ulcus pepticum)." Bijwerking: Vaak: Gastro-intestinale bloeding	

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

- Werkgroep Geneesmiddelen bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie 20-05-2019: Bij prasugrel en andere P2Y12-remmers is normaliter geen maagbescherming geïndiceerd. Dit zal bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan niet anders zijn. Wel krijgen zij standaard na de operatie een protonpompremmer (PPI) voorschreven (periode varieert: vaak 6 maanden). Het gebruik van een P2Y12-remmer leidt niet tot een advies voor langer PPI-gebruik. Er zijn geen gegevens over de opname van prasugrel.

Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee
		20 mei 2019