

Morbide obesitas: cangrelor

7057

BMI: body mass index; ASA: acetylsalicylzuur; RR = relatief risico; rRR = *ratio of Relative Risk*; BI = betrouwbaarheidsinterval; PCI: Percutane Coronaire Interventie; i.v. = intraveneus

Overig	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
Rocca B et al. Antithrombotic therapy and body mass: an expert position paper of the ESC working group on thrombosis. Eur Heart J 2018;39:1672-86 Suppl material		Er is geen bewijs dat de gebruikelijke dosering (per kg) aangepast moet worden in patiënten met overgewicht.	> 30 kg/m ² : zorg voor een accuraat gewicht en doseer zoals gebruikelijk (per kg)
SPC Kengrexal 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie / infusie (cangrelor) 23-03-2015		Deze verdunning zal een concentratie van 200 microgram/ml genereren en dient voldoende te zijn voor de benodigde dosering voor ten minste twee uur. Patiënten van 100 kg en meer zullen minimaal twee zakken nodig hebben.	

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	onbekend	nee	20 mei 2019