

Bariatrische chirurgie: cangrelor

7058

RYGB = Roux-en-Y gastric bypass, PPI = protonpompremmer

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg en chirurgie	Effect	Opmerkingen
-	-	-	-	-

Overig	BMI/kg en chirurgie	Effect	Opmerkingen
Brochure Geneesmiddelengebruik na bariatrische chirurgie. Nederlandse Obesitaskliniek, 2017.			Geen informatie over cangrelor
SPC Kengrexal, rev. 6, 26-04-2018		Contra-indicatie: "Actieve bloeding of een verhoogd risico op bloeding, als gevolg van gestoorde hemostase en/of irreversibele coagulatiestoornissen of als gevolg van een recente zware chirurgische ingreep of recent zwaar trauma of ongecontroleerde ernstige hypertensie." Waarschuwing: "In centrale onderzoeken die werden uitgevoerd bij patiënten die PCI ondergingen, GUSTO (Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries - mondiaal gebruik van strategieën voor het openen van geoccludeerde arteriën), deden matige en lichte bloedingsincidenten zich vaker voor bij patiënten die werden behandeld met cangrelor dan bij patiënten die werden behandeld met clopidogrel. Hoewel de meeste bloedingen in verband met het gebruik van cangrelor op de plek van de arteriële punctie optreden, kan hemorragie op elke plek optreden. Men dient voorzichtig te zijn met het gebruik van cangrelor bij patiënten met aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogd bloedingsrisico. Men dient voorzichtig te zijn met het gebruik van cangrelor bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die het risico op bloeding kunnen verhogen. Cangrelor heeft een halfwaardetijd van drie tot zes minuten. De bloedplaatjesfunctie is binnen 60 minuten na het stoppen met de infusie hersteld."	

		Bijwerking: Soms: "gastro-intestinale hemorragie"	
--	--	--	--

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	20 mei 2019