

Morbide obesitas: amoxicilline-clavulaanzuur

7134

Samenvatting

Er zijn kleine kinetische en klinische studies beschreven met amoxicilline bij patiënten met morbide obesitas. Deze studies waren te klein of in combinatie met andere antibiotica, waardoor geen harde conclusies getrokken kunnen worden. Er lijkt wel sprake te zijn van een verlaagde C_{max} en AUC, waardoor het advies gegeven wordt om maximaal te doseren. Voor amoxicilline/clavulaanzuur is geen aanvullende data bekend, maar wordt uitgegaan van de informatie over amoxiciline.

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
-				

Overig	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
SPC Augmentin 15 juli 2019		-Geen informatie over morbide obesitas	
Richtlijn: "How should antibiotics be dosed in obesity?" van UKCPA UK Medicines Information. Medicine Q&As; How should antibiotics be dosed in obesity. March 2017			Auteurs: Er is onvoldoende data beschikbaar. UKCPA adviseert om penicillines aan de bovengrens te doseren bij patiënten met obesitas.

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Ja	10 februari 2020