

Diënogest + CYP3A4-inductoren

MFB 7123

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Blode H. Contraception 2012;86:337-44. doi: 10.1016/j.contraception.2012.01.010.	dienogest + rifampicine	afname AUC dienogest met 83% (651→111 h*ng/ml) en Cmax met 52% (72.3→34.8 ng/ml) (afname AUC estradiolvaleraat met 44% (1261→710 h*ng/ml) en Cmax met 25% (75.0→56.4 ng/ml)) Regime: dienogest 3 mg/estradiolvaleraat 2 mg op dag 1-17, rifampicine 600 mg/dag dag 12-16; 16 gezonde postmenopauzale vrouwen.	3A
SPC Dienogest Stragen	dienogest + rifampicine	getal uit Blode 2012. ↓AUC dienogest met 83% en estradiol met 44% (bij steady state dienogest+estradiol) door rifampicine Advies: wordt niet gegeven.	2A

Overig	Stof	Effect
SPC Dienogest Stragen	dienogest + inductoren	ongewenste effecten zoals veranderingen in het uteriene bloedingsprofiel kunnen optreden.

Opmerkingen

Stockley: alleen genoemd bij de combipil, zelfde getallen als SPC.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Ja	6 juli 2020