

Morbide obesitas: Buprenorfine

7200

BMI, body mass index

Conclusie

Er zijn geen gegevens over de toepassing van buprenorfine bij patiënten met morbide obesitas.

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
-				

Overig	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
SPC Transtec juni 2018		Geen informatie over morbide obesitas	
SPC Temgesic mei 2019		Geen informatie over morbide obesitas	
SPC Suboxone (buprenorfine/naloxone) april 2019		Geen informatie over morbide obesitas	
Richtlijn Morbide Obesitas (2013)		Alle opiaten hebben hun bijwerking op de ademhaling, darmmotiliteit en misselijkheid. In de morbide obese patiënt is vooral het risico op ademhalingsproblemen verhoogd (apneu, desaturatie, hypoxie). Het postoperatief gebruik van opiaten dient daarom zo laag mogelijk te zijn om postoperatieve hypoxie, misselijkheid en ileus te voorkomen. Momenteel is onder experts de discussie of opiaten überhaupt wel gebruikt moeten worden na bariatrische chirurgie en of alleen het toepassen van een loco-regionale techniek niet voldoende is, naast een multimodale techniek.	

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	11-05-2020