

Levothyroxine + Semaglutide Oraal

M7179

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC + EPAR Rybelsus	levothyroxine + semaglutide oraal	levothyroxine ↑AUC (gecorrigeerd voor endogene waarden) 1.3x, ↓Cmax met 12% Regime: levothyroxine 600 µg 1-malig alleen of met steady state semaglutide 14 mg oraal.	2A

Overig	Stof	Effect
SPC Rybelsus	levothyroxine + semaglutide oraal	overweeg monitoring schildklierparameters bij combinatie met levothyroxine

Opmerkingen

Werkgroep IA 6-7-2020: een AUC stijging van 33% is niet veel, maar kan klinisch relevant zijn als de patiënt al hoog zit. Daarom toch actie Ja, meten na 4-6 weken.

Internist: monitor schildklierwaarden (of schildklierparameters) (dit omdat je per patient besluit welke parameter je het beste kunt vervolgen.) Indien dit een bezwaar is of te vaag dan in ieder geval: TSH, vrij-T4 en/of T3. Het zinnetje over 'vertel de patient over behoefte' lijkt me een goede aanvulling.

GIC: effect semaglutide subcutaan is niet onderzocht; s.c. gedraagt zich toch anders dan oraal semaglutide, s.c. geeft minder problemen lijkt het.

Stockley: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Ja	6 juli 2020