

Atorvastatine/Rosuvastatine/Midazolam MFB 7192 + Upadacitinib

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Rinvoq	Atorvastatine + Upadacitinib	↓ AUC atorvastatine met 23% en geen wijziging Cmax na combinatie met upadacitinib 30 mg 1 dd (2x aanbevolen dosis) gedurende meerdere dagen. Upadacitinib had geen relevant effect op plasmablootstelling aan ortho-hydroxyatorvastatine (belangrijke actieve metaboliet van atorvastatine).	1A
	Rosuvastatine + Upadacitinib	↓ AUC rosuvastatine met 33% en ↓ Cmax met 23% na combinatie met upadacitinib 30 mg 1 dd gedurende meerdere dagen.	
SPC Rinvoq	Midazolam + Upadacitinib	↓ Cmax en AUC midazolam 26% na combinatie met upadacitinib 30 mg 1dd (2x aanbevolen dosis). Dit geeft aan dat eenmaal daags 30 mg upadacitinib een zwak inducerend effect heeft op CYP3A.	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Rinvoq	Atorvastatine / Rosuvastatine + Upadacitinib	geen aanpassing dosis aanbevolen voor rosuvastatine of atorvastatine bij combinatie met upadacitinib.
SPC Rinvoq	Midazolam + Upadacitinib	geen aanpassing dosis aanbevolen voor CYP3A-substraten bij combinatie met upadacitinib.

Opmerkingen

Stockley: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Nee	24 september 2020