

Dialyse hemodialyse: zanamivir parenteraal

7241

Cl_{cr} = creatinineklaring, Cl_{CRRT}= klaring continue niervervangingstherapie

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Dectova	Er zijn beperkte gegevens over de blootstelling aan zanamivir tijdens gelijktijdige continue niervervangingstherapie en zeer beperkte gegevens voor dialyse. Bij CL_{cr} of CL_{CRRT} (ml/min of ml/min/1,73m²) < 15 ml/min: aanvangsdosis 600 mg. Onderhoudsdosis 60 mg 2x per dag. Begin met de onderhoudsdosis 48 uur na de aanvangsdosis. gevolgd door onderhoudsdosering 60 mg 2x per dag. Aan patiënten op intermitterende hemodialyse of intermitterende peritoneale dialyse dient de dosis gegeven te worden na afronding van de dialyse. Aan patiënten die continue niervervangingstherapie krijgen, dient de dosis bepaald te worden aan de hand van de toepasselijke CRRT-klaring (CL_{CRRT} in ml/min) Zanamivir wordt geklaard door renale uitscheiding en het wordt verwacht dat het door hemodialyse wordt verwijderd

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	16 november 2020