

Clcr = creatinineklaring

| Onderbouwend              | Bewijs | Effect                                                                                                                                                                                                   | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPC Lynparza<br>11-7-2019 | 0      | Clcr 51-80 ml/min: AUC met 24% en Cmax met 15% verhoogd;<br>Clcr 31-50 ml/min: AUC met 44% en Cmax met 26% verhoogd vergeleken met patiënten met normale nierfunctie.<br>Clcr ≤ 30 ml/min: geen gegevens | Clcr 51-80 ml/min: aanpassing niet nodig<br>Clcr 31-50 ml/min:<br>capsules: 300 mg tweemaal daags<br>tabletten: 200 mg tweemaal daags<br>Clcr ≤ 30 ml/min: niet aanbevolen vanwege ontbreken gegevens.<br>Lynparza mag alleen toegediend worden aan patiënten met ernstige nierinsufficiëntie als het voordeel opweegt tegen het potentiële risico en de nierfunctie van de patient en het optreden van bijwerkingen nauwgezet gecontroleerd worden. |

|             |  |
|-------------|--|
| Risicogroep |  |
|-------------|--|

## Opmerkingen:

- Werkgroep: bij Clcr 30-50 ml/min advies SPC volgen; zonde om 'vermijden' te doen bij Clcr < 30 ml/min, want bijwerkingen zijn goed te monitoren, beoogd effect en risico's afwegen.

|                      | Wijziging kinetiek | Actie | Clcr grens | Datum           |
|----------------------|--------------------|-------|------------|-----------------|
| Beslissing werkgroep | Ja                 | Ja    | 50 ml/min  | 12 januari 2021 |