

Morbide obesitas: Piritramide

7349

Afkortingen

BMI = Body Mass Index

CONCLUSIE

Er zijn geen gegevens over de toepassing van piritramide bij patiënten met morbide obesitas. Bij toepassing van een 'fixed dose' is geen overdosering te verwachten. Bij doseren in mg/kg lichaamsgewicht wordt via de doseringsbewaking bewaakt op overdosering. Daarom is geen actie nodig.

Opmerkingen

Bij gebruik van opiaten bij morbide obesen wordt geadviseerd rekening te houden met de beperkte zuurstofreserve en om te starten met een zo laag mogelijke dosering.

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
-				

Overig	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
SPC Dipidolor Maart 2019		Geen informatie over (morbide) obesitas.	
Richtlijn Morbide Obesitas (2013)		Alle opiaten hebben hun bijwerking op de ademhaling, darmmotiliteit en misselijkheid. In de morbide obese patiënt is vooral het risico op ademhalingsproblemen verhoogd (apneu, desaturatie, hypoxie). Het postoperatief gebruik van opiaten dient daarom zo laag mogelijk te zijn om postoperatieve hypoxie, misselijkheid en ileus te voorkomen. Momenteel is onder experts de discussie of opiaten überhaupt wel gebruikt moeten worden na bariatrische chirurgie en of alleen het toepassen van een loco-regionale techniek niet voldoende is, naast een multimodale techniek.	

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	18-01-2021