

Bariatrische chirurgie: Tapentadol

7352

AFKORTINGEN

PR = prolonged release

i.m. = intramusculair

CONCLUSIE

Op basis van de gevonden literatuur lijkt er geen actie nodig te zijn bij de toepassing van tapentadol bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan.

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
Iapichino MC. Tapentadol prolonged release for pain control in a frail obese patient: a case report. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019;23(4 Suppl):51-54.	1	>40kg/m ² (n=1)	Belangrijkste resultaten: Case report Een obese patiënt die bariatrische chirurgie (bariatric biliary-intestinale bypass) heeft ondergaan kreeg tapentadol opgetitreerd tot 150 mg PR 2 keer per dag als onderhoudsdosering. Deze dosis was effectief. Na een episode van aanhoudende duizeligheid werd tapentadol PR gestaakt. Hierna werd gestart met een cocktail van 7 verschillende pijnstillers: steroïden gedurende twee weken, myorelaxantia, twee types NSAIDs (beide i.m. injecties en oraal), pijnstillers zo nodig en neurotrofe geneesmiddelen. Dit was echter niet effectief. Tapentadol werd herstart in een dosering van 50 mg PR twee keer per dag, dit gaf al verbetering. De dosis werd opgetitreerd naar 150 mg PR twee keer per dag. Dit zorgde voor optimale pijnstilling. De andere pijnstillers werden gestaakt. Tapentadol 150 mg PR 2 keer per dag werd beter verdragen en gaf minder bijwerkingen dan de eerdere cocktail aan pijnstillers.	Opmerkingen KNMP: De dagdosering van 150 mg PR 2 keer per dag wordt in Nederland ook gebruikt. Deze dosis lijkt veilig en effectief bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Het is niet bekend welke middelen en in welke dosering gebruikt werden in de cocktail.

Overig	BMI / kg	Effect	Opmerkingen
SmPC PALEXIA Retard Oktober 2019		Geen informatie over bariatrische chirurgie.	
SmPC Palexia Oktober 2019		Geen informatie over bariatrische chirurgie.	

Risicogroep	-
-------------	---

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	18-01-2021