

Verkeersdeelname: Itraconazol 7374



Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 12 juli 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft itraconazol ingedeeld in categorie 0 op basis van de beschikbare literatuur. Itraconazol heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN

-

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Er is geen farmacologisch mechanisme waaruit blijkt dat itraconazol invloed heeft op de rijvaardigheid. DRUID heeft itraconazol niet ingedeeld.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft itraconazol niet ingedeeld.

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SPC Itraconazol (Trisporal O.S.-drank) 10 mei 2021 SPC Itraconazol (CF capsules) 1 april 2021	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Bij het besturen van een voertuig en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot het optreden van bijwerkingen zoals duizeligheid, visuele stoornissen en gehoorverlies (zie rubriek 4.8) 4.8 Bijwerkingen Gehoorverlies Voorbijgaand of permanent gehoorverlies is gemeld bij patiënten die behandeld werden met itraconazol. Bij verschillende van deze meldingen betrof het gelijktijdig gebruik van kinidine, wat gecontra-indiceerd is. Het gehoorverlies verdwijnt meestal zodra de behandeling wordt gestopt, maar kan bij sommige patiënten aanhouden. Vaak ($\geq 1/100$ tot $< 1/10$): Duizeligheid Soms ($\geq 1/1\ 000$ tot $< 1/100$): Visuele stoornissen (waaronder diplopie en troebel zicht) Onbekend: Voorbijgaand of blijvend gehoorverlies

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Nee	Nee	0	11 oktober 2021