

Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 16 juni 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft voriconazol ingedeeld in categorie 1 op basis van de beschikbare informatie. Voriconazol passeert de bloed-hersenbarrière en kan invloed hebben op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN

Voriconazole passeert de bloed-hersenbarrière, hierdoor kan voriconazol invloed hebben op de rijvaardigheid.

De KNMP neemt effecten op het gezichtsvermogen niet mee in de beoordeling van de rijvaardigheid, omdat ze door de patiënten zelf goed te beoordelen zijn.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive) [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid]
- category I (minor influence on fitness to drive) [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid]
- category II (moderate influence on fitness to drive) [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid]
- category III (severe influence on fitness to drive) [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co- ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft voriconazol niet beoordeeld

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SPC Voriconazol ADOH (INJECTIE)– 3 april 2019	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Voriconazol heeft een matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Het kan aanleiding geven tot voorbijgaande en reversibele veranderingen van het gezichtsvermogen met inbegrip van wazig zien, veranderde of verhoogde visuele waarneming en/of fotofobie. Patiënten met deze symptomen dienen dan ook mogelijk gevaarlijke handelingen te vermijden, zoals het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. 4.8 Bijwerkingen Vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$): hallucinaties, insomnia, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid Zeer vaak ($>1/10$): visuele stoornis Opmerkingen KNMP: Invloed op het gezichtsvermogen wordt niet meegenomen in de beoordeling
SPC Voramol (TABLET)– 3 juli 2020	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Voriconazol heeft een matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Het kan aanleiding geven tot voorbijgaande en reversibele veranderingen van het gezichtsvermogen met inbegrip van wazig zien, veranderde of verhoogde visuele waarneming en/of fotofobie. Patiënten met deze symptomen dienen dan ook mogelijk gevaarlijke handelingen te vermijden, zoals het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. 4.8 Bijwerkingen Vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$): insomnia, hallucinaties, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid Zeer vaak ($>1/10$): visuele stoornis Opmerkingen KNMP: Invloed op het gezichtsvermogen wordt niet meegenomen in de beoordeling

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Ja	Ja	I	11 oktober 2021