

Nierfunctie: acarbose

1238

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Glucobay 8-10-2000	0		Glucobay wordt afgeraden bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (Clcr<25 ml/min).

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Nee	Nee	-	22 maart 2005

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 22-3-2005: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van acarbose niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Hoewel de fabrikant het gebruik van acarbose ontraadt bij Clcr < 25 ml/min, ontbreken studies die dit onderbouwen. De werking van acarbose is gebaseerd op remming van darmenzymen; na enzymatische afbraak wordt ong. 35% geabsorbeerd, hiervan wordt 1,7% met de urine uitgescheiden. Literatuur: - Registratiedossier deel IB Glucobay.
----------------	---