

Nierfunctie: Adalimumab

1250

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	Effect	opmerkingen

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Descamps-Latscha B ea. Balance between IL-1 beta, TNF-alpha, and their specific inhibitors in chronic renal failure and maintenance dialysis. Relationships with activation markers of T cells, B cells, and monocytes. J Immunol. 1995;154:882-92 en Pereira BJ ea. Plasma levels of IL-1 beta, TNF alpha and their specific inhibitors in undialyzed chronic renal failure, CAPD and hemodialysis patients. Kidney Int. 1994;45:890-6. Hierin wordt beschreven dat er een lineaire correlatie is tussen TNF alfa en Clcr. Dit geldt ook voor lichaamseigen inhibitoire receptoren. Dit geeft een sterke aanwijzing dat de nier een belangrijke rol speelt in de klaring van deze stoffen.
- Registratiedossier (SPC) Humira 21-10-2003: Humira is niet onderzocht bij patiënten met verminderde nierfunctie. Er kan geen aanbeveling voor dosering worden gegeven. Oudere patiënten: aanpassing van de dosis is niet vereist.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	nee	--	24 mei 2005

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 24-5-2005: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van adalimumab niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van adalimumab bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Literatuur: - Registratiedossier (SPC) Humira.
----------------	---