

Nierfunctie: nebivolol

1294

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-	-	
Risicogroep			

Opmerkingen

- SPC Nebilet 12-12-2003: bij patiënten met nierinsufficiëntie is de aanbevolen aanvangsdosis 2,5 mg per dag. Indien nodig kan de dosering worden verhoogd naar 5 mg per dag. Nebivolol wordt intensief gemetaboliseerd, onder andere tot actieve hydroxymetabolieten.
- Aanvullende informatie fabrikant (tel. 24-8-2005): uit farmacokinetisch onderzoek (data on file) blijkt dat bij nierfunctiestoornissen de plasmaspiegel is verhoogd. Hydroxymetaboliet is actief. Uit veiligheidsoverwegingen wordt daarom verlaging dosering aangeraden.
- Projectgroep 30-9-2008: geen actie nodig, de indicatiegroep (geregistreerd bij chronisch hartfalen bij personen > 70 jaar) zal per definitie een patiëntengroep met verminderde nierfunctie zijn; hierbij wordt gedoseerd op geleide van bijwerkingen.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Nee	-	30 september 2008