

Nierfunctie: cyproheptadine

1350

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	Effect	opmerkingen
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Periactin 9-1- 2002	0	De belangrijkste metaboliet in menselijke urine werd geïdentificeerd als een kwaternair ammonium-glucuronideconjugaat van cyproheptadine. De uitscheiding neemt af bij nierinsufficiëntie.	

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Micromedex(R) Healthcare Series Vol. 125: Metabolites: Quaternary ammonium chloride conjugate, inactive (Prod Info Periactin(R), 1999).

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Nee	-	14 februari 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 14-2-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van cyproheptadine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. De fabrikant van cyproheptadine vermeldt dat bij patiënten met een verminderde nierfunctie de uitscheiding van de belangrijkste metaboliet, het kwaternair ammonium-glucuronideconjugaat, afneemt. Deze metaboliet is niet actief. Er zijn verder geen studies gedaan naar het gebruik van cyproheptadine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Literatuur: - Registratiedossier (deel IB) Periactin.
----------------	--