

Nierfunctie: ketotifen

1358

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	opmerkingen
-	-		

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Zaditen 5-10- 2004. Hierin staat niets vermeld over het gebruik van ketotifen bij een verminderde nierfunctie.

Clcr < 10 ml/min:

- Tang S ea. Resolution of eosinophilic peritonitis with ketotifen. Am J Kidney Dis 1997;30:433-6. Een patiënt die intermitterend peritoneale dialyse krijgt, wordt gedurende 3 weken succesvol behandeld met 2 maal daags 1 mg ketotifen.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	14 februari 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 14-2-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van ketotifen niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van ketotifen bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.
----------------	--