

Nierfunctie: rivastigmine

1384

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Registratiedossier (SPC) Exelon 22-9-2004.	0	Cmax en AUC van rivastigmine waren meer dan twee maal zo hoog bij personen met matige nierinsufficiëntie vergeleken met gezonde personen; er waren echter geen veranderingen in Cmax en AUC van rivastigmine gevonden bij personen met ernstige nierinsufficiëntie.	Gezien de toegenomen blootstelling bij gestoorde nierfunctie dient de aanbeveling om de dosis te titreren tot de individuele verdraagbaarheid nauwgezet te worden gevolgd.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Nee	-	14 februari 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 14-2-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van rivastigmine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. De dosis wordt ingesteld op geleide van het effect. Dit is bij een verminderde nierfunctie niet anders. Literatuur: - Registratiedossier (SPC) Exelon.
----------------	---