

Nierfunctie: zolpidem

1439

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Stilnoct 15-4-2004: hierin wordt niets vermeld over het gebruik bij een verminderde nierfunctie.

Clcr < 10 ml/min:

- Fillastre JP ea. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of zolpidem following repeated doses in hemodialyzed uraemic patients. Fundam Clin Pharmacol 1993;7:1-9. Cmax, Tmax, AUC en t1/2 zijn niet anders bij 12 dialysepatiënten. Zolpidem kan veilig gebruikt worden door patiënten met een sterk verminderde nierfunctie zonder aanpassing van het doseringsschema.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	18 april 2006
Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 18-04-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van zolpidem niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van zolpidem bij patiënten met een verminderde nierfunctie met Clcr > 10 ml/min. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.			