

Nierfunctie: estramustine

1486

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Estracyt 9-12-2005: een verergering van pre-existerend of beginnend oedeem of decompensatio cordis is waargenomen bij sommige patiënten die met Estracyt werden behandeld. Andere aandoeningen die kunnen worden beïnvloed door vochtretentie, zoals epilepsie, migraine of nierfalen, vereisen nauwgezette observatie. Daar Estracyt het metabolisme van calcium en fosfor kan beïnvloeden dient het met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met metabole botaandoeningen die gerelateerd zijn aan hypercalciëmie of bij patiënten met renale insufficiëntie.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	6 juni 2006
Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 6-6-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van estramustine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van estramustine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.			