

Nierfunctie: lomustine

1494

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	opmerkingen
-			

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Belustine 12-9-2005: hierin wordt niets vermeld over het gebruik bij een verminderde nierfunctie.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	6 juni 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 6-6-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van lomustine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van lomustine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Het wordt hoofdzakelijk met de urine uitgescheiden in de vorm van metabolieten. Bovendien wordt het slechts eenmaal per behandelingsperiode van enkele weken toegepast, zodat cumulatie niet waarschijnlijk is.
----------------	--