

Nierfunctie: tipranavir

1511

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (SPC) Aptivus 25-10-2005: de farmacokinetiek van tipranavir is niet onderzocht bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Aangezien de renale klaring van tipranavir verwaarloosbaar is, wordt er geen verlaging van de totale lichaamsklaring verwacht bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	nee	-	6 juni 2006
Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 6-6-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van tipranavir niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van tipranavir bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de nierfunctie wijzigt bij een verminderde nierfunctie. De renale klaring van tipranavir is verwaarloosbaar.			