

Nierfunctie: chloordiazepoxide

1517

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) (Chlordiazepoxidum Pharmachemie 11-5-1988: ouderen en patiënten met lever- of nierfunctiestoornis bij voorkeur behandelen met benzodiazepine met korte tot middellange $t_{1/2}$. Bij bejaarden en patiënten met lever- of nierfunctiestoornis dosering chloordiazepoxide halveren. Overdosering: hemodialyse is van weinig nut.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	11 mei 2004

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 11-5-2004: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van bromazepam niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van chloordiazepoxide bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.			
----------------	--	--	--	--