

Nierfunctie: clobazam

1518

Clcr = creatinineklaring. GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Frisium 27-3-1990: ouderen en patiënten met lever- of nierfunctiestoornis: lager dan gebruikelijke dosering. Overdosering: hemodialyse is van weinig nut.

Clcr < 10 ml/min:

- Roberts GW ea. Clobazam and N-desmethyclobazam serum concentrations in endstage renal failure and hemodialysis. Ann Pharmacother 1994;28:966-7. Concentraties van clobazam en N-desmethyclobazam van 1 patiënt met GFR <10ml/min en 3x per week hemodialyse die gedurende langere tijd 5 mg clobazam gebruikte, waren vergelijkbaar met concentraties in patiënten met een normale nierfunctie.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	11 mei 2004

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 11-5-2004: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van clobazam niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van clobazam bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.
----------------	---