

# Nierfunctie: prazepam

1528

Clcr = creatinineklaring

| Bron        | Bewijs | Effect | Opmerkingen |
|-------------|--------|--------|-------------|
| -           |        |        |             |
| Risicogroep |        |        |             |

## Opmerkingen:

- Registratiedossier (eel IB) Reapam 16-5-2003: normale dosering volwassenen: 20-40 mg. Patiënten met nierfunctiestoornis: beginnen met 10-15 mg/dag. Ouderen en patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen bij voorkeur behandelen met benzodiazepinen met korte tot middellange eliminatiehalfwaardetijd en lagere dosering. Overdosering: hemodialyse is van weinig nut.

|                         | Wijziging kinetiek | Actie | Clcr grens | Datum       |
|-------------------------|--------------------|-------|------------|-------------|
| Beslissing projectgroep | Onbekend           | Nee   | -          | 11 mei 2004 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raadpleegtekst | <p>Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 11-5-2004: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van prazepam niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen.</p> <p>Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van prazepam bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie.</p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|