

Nierfunctie: nalbufine

1619

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier (SPC) Nalbufine HCl Orpha 12-9-2005: daar nalbufine in de lever wordt omgezet en door de nieren wordt uitgescheiden, kunnen patiënten met gestoorde nier- of leverfuncties een abnormale reactie vertonen op normale doses. Bij deze personen dient nalbufine met voorzichtigheid en in kleinere hoeveelheden te worden gebruikt.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	24 mei 2005

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 24-5-2005: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van nalbufine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van nalbufine bij patienten met een verminderde nierfunctie. De dosering van opioïden wordt ingesteld op geleide van het effect. Dit is bij een verminderde nierfunctie niet anders.
----------------	--