

Nierfunctie: clofazimine

1621

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Registratiedossier (deel IB) Lampren 04-08-2004. Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent de farmacokinetische effecten van clofazimine m.b.t. nierfunctiestoornissen. Bij patiënten met nierbeschadigingen dient de behandeling met clofazimine plaats te vinden onder toezicht van een arts, met regelmatige controle van nierfunctie. Niet meer dan 0,4% van de dosis wordt in de urine na 24 uur als onveranderd clofazimine teruggevonden. De urinaire metabolieten komen overeen met ongeveer 0,6% van de dagelijkse dosis.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	13 december 2005
Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 13-12-2005: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van clofazimine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Per patiënt gebruik afwegen en dosering bepalen. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van clofazimine bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat de kinetiek wijzigt bij een verminderde nierfunctie. Minder dan 1% van de dagelijkse dosis wordt onveranderd of in de vorm van metabolieten via de urine uitgescheiden.			