

Nierfunctie: itraconazol oraal

1630

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Boelaert J ea. Itraconazole pharmacokinetics in patients with renal dysfunction. Antimicrob Agents Chemother 1988;32:1595-7.	2	Er zijn geen significante verschillen in AUC 0-8, Tmax en Cmax na 1-malig 200 mg itraconazol oraal bij 7 personen met Clcr 6-25 ml/min, 7 hemodialysepatiënten en 5 CAPD patiënten. Binnen de groepen is er veel interindividuele variabiliteit. De gevonden waarden zijn vergelijkbaar met die van gezonde vrijwilligers in een andere studie. Ook hierbij is er veel interindividuele variabiliteit wat veroorzaakt kan worden door verschillen in absorptie en hepatisch metabolisme.	

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- SPC Trisporal 15-10-2009: er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het orale gebruik van itraconazol bij patiënten met nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Nee	Nee	-	26 september 2006