

Nierfunctie: fluvoxamine

1654

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Fevarin tabletten 3-11-2005.	0	De farmacokinetiek bij gezonde vrijwilligers, ouderen en patiënten met nierinsufficiëntie is vergelijkbaar.	Bij patiënten met nierinsufficiëntie dient de behandeling met een lage dosis onder zorgvuldige begeleiding te worden begonnen. Aanvullende informatie fabrikant 26-10-2006: geen studiegegevens voorhanden, advies behandeling met lage dosering beginnen komt wellicht uit veiligheidsoverweging voort uit feit dat fluvoxamine mogelijk eigen metabolisme remt.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

Clcr <10 ml/min

- Kamo T ea. Efficacy and pharmacokinetics of fluvoxamine maleate in patients with mild depression undergoing hemodialysis. Psych Clin Neurosciences 2004;58:133-7. Afname plasmaconcentratie gem. 22% door hemodialyse bij 3 Japanse patiënten na toediening fluvoxamine 1 dd 50 mg oraal gedurende 29 dagen.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Nee	Nee	--	21 november 2006

Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 21-11-2006: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van fluvoxamine niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Er zijn geen aanwijzingen dat de kinetiek van fluvoxamine wijzigt bij verminderde nierfunctie. Fluvoxamine wordt alleen in de vorm van inactieve metabolieten via de nieren uitgescheiden. Literatuur: - Registratiedossier (deel IB) Fevarin tabletten.
----------------	---