

Nierfunctie: treprostinil

2287

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- SPC Remodulin 12-05-2006: Daar treprostinil en zijn metabolieten voornamelijk via de nieren worden uitgescheiden, dient voorzichtigheid te worden betracht bij behandeling van patiënten met niereninsufficiëntie om schadelijke gevolgen gerelateerd aan mogelijke verhoging van systemisch blootstelling te vermijden.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	30 september 2008
Raadpleegtekst	Besluit van de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp Geneesmiddelinformatie op 30-9-2008: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van treprostinil niet nodig. Bij creatinineklaring kleiner dan 10 ml/min: een algemeen advies kan niet worden gegeven. Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik van treprostinil bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Treprostinil en zijn metabolieten worden voornamelijk via de nieren uitgescheiden. De behandeling met treprostinil vindt plaats op geleide van effect, bloeddruk en hartfrequentie; dit is bij verminderde nierfunctie niet anders. Literatuur: - SPC Remodulin.			