

Nierfunctie: nelarabine

2290

Clcr = creatinineklaring, CL/F = schijnbare klaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
ref. 1 SPC Atriance 20-09-2007.	0	In klinische studies met volwassenen en kinderen bleek de gemiddelde CL/F van ara-G (purinenucleoside-antimetabolië) ong. 7% lager bij patiënten met Clcr 50-80 ml/min (n=12) dan bij patiënten met Clcr > 80 ml/min (n=56).	Er zijn geen gegevens beschikbaar om een doseringadvies te kunnen geven voor patiënten met Clcr < 50 ml/min.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Registratiedossier National PBM Drugs Monograph, Nelarabine (Arronon) januari 2007 (Amerikaanse productinformatie): hierin wordt vermeld dat bij Clcr 50-80 ml/min de gemiddelde Cl/F van ara-G 15% lager is. Volgens de Nederlandse fabrikant GlaxoWellcome is de informatie in het SPC juist, dus CL/F 7% lager. Zij hebben de Amerikaanse collega's hierop geattendeerd.
- Projectgroep: wordt toegepast door hematologen. Specialistisch indicatiegebied waarbij aandoening waarschijnlijk veel belangrijker is dan bijwerkingen etc.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Nee	-	30 september 2008