

Nierfunctie: kaliumchloride

2431

Clcr = creatinineklaring

Bron	bewijs	effect	opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- Projectgroep: kalium wordt gesuppleerd op geleide van de kaliumspiegel. Er wordt niet standaard een ECG gemaakt.
- SPC Slow-K 5-8-2005: ernstige nierfunctiestoornis is contra-indicatie. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van kaliumzouten aan patiënten met een verminderde nierfunctie, omdat zij een verhoogd risico lopen een hyperkaliëmie te ontwikkelen. Controle van het serumkalium is gewenst in gevallen van langdurige substitutietherapie en moet zeker worden uitgevoerd bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Het klinische beeld van een acute overdosering (intoxicatie) met kalium wordt voornamelijk gekenmerkt door hyperkaliëmie, tezamen met cardiovasculaire en neuromusculaire stoornissen, die – bij het bestaan van nierfunctiestoornissen – zich reeds kunnen manifesteren na betrekkelijk lage doses Slow-K 600.
- SPC Kaliumchloride CF 74,6 en 100 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. Nierpatiënten dienen een lagere dosering te krijgen. Kaliumzouten moeten zorgvuldig onder ECG-controle worden toegediend aan patiënten in situaties waarbij hyperkaliëmie is te verwachten, zoals bij renale insufficiëntie.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	--	21 november 2006