

Nierfunctie: flutamide

2578

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Anjum S ea. Pharmacokinetics of flutamide in patients with renal insufficiency. Br J Clin Pharmacol 1999;47:43-7.	2	verminderde nierfunctie had weinig effect op de farmacokinetiek van de werkzame hydroxymetaboliet na 1-malig 250 mg flutamide bij personen met Clcr > 80 ml/min (n=6), Clcr 50-80ml/min (n=7), Clcr 30-49ml/min (n=3), Clcr 5-29 ml/min (n=4) en Clcr < 5 ml/min (n=6, hemodialyse) personen op hemodialyse kregen flutamide 250 mg 4 uur voor de dialyse en direct na de dialyse.	Based on plasma hydroxyflutamide concentration, dose reductions is not required in patients with chronic renal insufficiency. Neither flutamide nor hydroxyflutamide were significantly removed bij haemodialysis, making dosage supplementation after dialytic therapy unnecessary.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen

SPC Flutamide Mylan januari 2008: met voorzichtigheid toedienen aan patiënten met verminderde nierfunctie.

Clcr < 10 ml/min:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Nee	Nee	-	23 februari 2010