

Nierfunctie: olsalazine

2583

Clcr = creatinineklaring

Bron	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- SPC Dipentum 21-11-2006: ernstige nierfunctiestoornis is contra-indicatie. Bij langdurig behandeling is regelmatige controle van de nierfunctie gewenst.
- CBO richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen, 2008: Aminosalicylaten: nierfunctiecontrole bij risicopatiënten (pre-existente nierschade, nefrotoxische comedatie of andere vasculair comorbiditeit) elke 3-6 maanden, anders 1x per 12 maanden. De aanbevolen jaarlijkse controle van creatinineconcentratie heeft niet aangetoond permanent nierfunctieverlies bij gecompromitteerde patiënten te voorkomen, alhoewel in vroeg stadium ontdekt nierfunctieverlies reversibel lijkt.

Bijwerkingen:

- Wilcox GM ea. Nephrotoxicity associated with olsalazine. Am J Med 1996;100:238-40. Bij man (71), bekend met ziekte van Crohn sinds 19 jaar, onstond koorts, nachtelijk zweten en gewichtsverlies 8 maanden na start olsalazine 250 mg 2dd. Serumcreatinine 2.7 mg/dl (= Clcr 25 ml/min met MDRD), was 2 maanden eerder 1.2 mg/dl (= Clcr 63 ml/min met MDRD). Na 3 weken behandeling antibiotica zonder succes trad visusstoornis op met episodes van blindheid gedurende 10 min. Serumcreatinine naar 3.1 mg/dl (= Clcr 21 ml/min met MDRD). Nierbiopsie toonde ernstige interstitiële nefritis. Olsalazine werd gestaakt. Patiënt werd snel koortsvrij en na 2 dagen waren oogklachten verdwenen. Serumcreatinine na 1 jaar 1.9 mg/dl (= Clcr 78 ml/min met MDRD).

Clcr < 10 ml/min:

-

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	23 februari 2010