

Nierfunctie: dacarbazine

3033

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- SPC Deticéne: vermeldt niets over het gebruik bij verminderde nierfunctie. Bijwerkingen: zelden niertoxiciteit; treedt later op in vergelijking met andere alkylerende middelen (ca. 21 dagen).

Clcr < 10 ml/min:

- Tezuka K ea. A case of liver metastasis from anorectal malignant melanoma on hemodialysis treated by chemotherapy. Gan To Kagaku Ryoho 2007;34:1709-12 (artikel in Japans, alleen Engelse abstract in bezit GIC). Man (61 jaar) op hemodialyse 3x per week werd behandeld met dacarbazine 100 mg op 5 achtereenvolgende dagen elke 4 weken vanwege levermetastasen door anorectale kanker. Na 12 kuren dacarbazine waren levermetastasen stabiel, maar longmetastasen progressief en overleed hij vanwege respiratoire insufficiëntie. Tijdens de behandeling met dacarbazine werd geen ernstige toxiciteit gezien.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing projectgroep	Onbekend	Nee	-	8 februari 2011