

Nierfunctie: fenprocoumon

3052

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Marcoumar 27-12-2001	nierinsufficiëntie heeft geen noemenswaardige invloed op de halfwaardetijd. Manifeste nierinsufficiëntie is gecontra-indiceerd.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Werkgroep: bij verminderde nierfunctie is geen actie nodig. De dosering van fenprocoumon wordt bepaald door de trombosedienst op basis van de INR; dit is bij patiënten met verminderde nierfunctie niet anders.
- Limdi NA ea. Kidney function influences warfarin responsiveness and hemorrhagic complications. J Am Soc Nephrol 2009; doi: 10.1681/ASN.2008070802. Secundaire analyse van een prospectieve cohort met patiënten met Clcr $\geq$ 60 ml/min (n=336), 30-59 ml/min (n=176) en $<$ 30 ml/min (n=53). Follow up 2 jaar. Na bijstellen op klinische en genetische factoren: patiënten met Clcr $<$ 30 ml/min hadden een lagere dosering warfarine nodig, hadden vaker ernstige bloedingen en vaker een INR buiten het streefgebied tov de patiënten in de andere nierfunctiegroepen. De auteurs suggereren dat bij Clcr $<$ 30 ml/min een lagere startdosering nodig is en dat frequentere controle nodig is.

Clcr $<$ 10 ml/min:

–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	-	9 mei 2017