

Nierfunctie: cabergoline

3448

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Ontkrachtend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Dostinex 3-10-2008	0	de farmacokinetiek van cabergoline bleek niet veranderd te zijn bij 12 patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie.	dosisaanpassing is niet nodig bij nierinsufficiëntie

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- 22-6-2011: nagevraagd bij de fabrikant (Pfizer), maar geen publicatie of data on file ontvangen.

Clcr < 10 ml/min:

- Piccoli GB ea. Prolactinoma in a diabetic dialysis patient with erectile dysfunction: a difficult differential diagnosis. Rev Diabet Stud 2006;3:200-4: bij een 44-jarige obese diabetespatiënt, sinds 3 jaar op hemodialyse, onstaat erectiestoornis. Hyperprolactinemie werd aangetoond. Behandeling met cabergoline 0.5 mg 2x peer week gaf snel klinisch respons, klachten verdwenen en na 2 maanden was het hormonaal beeld genormaliseerd.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Nee	Nee	-	1 november 2011