

Nierfunctie: albendazol

3502

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Effect	Opmerkingen
Seenu V ea. Primarypelvic hydatid cyst presenting with obstructive uropathy and renal failure. Postgrad Med J 1994;70:930-2.	man (38) met hydatide-cyste in het bekken waardoor obstructieve uropathie leidend tot chronisch verminderde nierfunctie (serumcreatinine 1167 $\mu\text{mol/l}$ = MDRD 5 ml/min). Preoperatief albendazol 1.2 g/dag gedurende 8-12 weken icm chirurgische verwijdering was effectief. Na 18 maanden follow-up serumcreatinine 166 $\mu\text{mol/l}$ (MDRD 43 ml/min)	

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- SPC Eskazole 26-4-2011: renale klaring van albendazol en de actieve metaboliet albendazolsulfoxide is verwaarloosbaar. Het is daarom onwaarschijnlijk dat een verminderde nierfunctie effect heeft op de klaring van de beide verbindingen. Bij patiënten met verminderde nierfunctie is geen aanpassing van de dosering nodig.

Clcr < 10 ml/min:

–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Nee	Nee	-	1 november 2011