

Nierfunctie: naltrexon

3503

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			
Risicogroep			

Opmerkingen:

- SPC Naltrexon Sandoz 4-9-2006: aangezien naltrexon hoofdzakelijk door de nieren wordt uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden bij nierinsufficiëntie.
Bij gezonde vrijwilligers die naltrexon 800 mg/dag gedurende 7 dagen innamen is geen toxiciteit vastgesteld.

- → Werkgroep: naltrexon wordt nauwlettend getitreerd in de verslavingszorg.

Clcr < 10 ml/min:

- Kambia NK ea. Pharmacokinetics and dialysability of naltrexone in patients undergoing hemodialysis. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2004;29:225-30: 7 patiënten op hemodialyse kregen 1-malig 50 mg naltrexon oraal vóór de dialysesessie. Hemodialyse had geen invloed op de naltrexonbloedspiegel. Aanpassing van de dosering van naltrexon is niet nodig bij dialyse afhankelijke patiënten. Suppletie post-dialyse is niet nodig.

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	-	1 november 2011