

Nierfunctie: dulaglutide

5697

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Trulicity 19-12-2014.	Er is zeer beperkte ervaring bij patiënten met eGFR [volgens CKD-EPI] < 30 ml/min/1,73 m²) of nierziekte in eindstadium, dulaglutide wordt niet aanbevolen. In een klinisch-farmacologische studie was de farmacokinetiek van dulaglutide vergelijkbaar tussen gezonde proefpersonen en patiënten met een lichte tot ernstige nierfunctiestoornis (CrCl < 30 ml/min), waaronder nierziekte in het eindstadium (waarvoor dialyse nodig was). In klinische studies was het veiligheidsprofiel van dulaglutide bij patiënten met matige nierfunctiestoornis vergelijkbaar met de algehele T2DM-populatie. Aan deze studies namen geen patiënten met ernstige nierfunctiestoornis of nierziekte in het eindstadium deel. Maagdarmstelselstoornissen en hypoglykemie zijn effecten van overdosering die in klinische studies met dulaglutide zijn gezien.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- PubMed search 11-8-2015: geen gegevens.

Clcr < 10 ml/min:

–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	-	16 februari 2016