

Nierfunctie: pomalidomide

5739

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Imnovid	Er is geen onderzoek uitgevoerd met pomalidomide bij proefpersonen met een nierfunctiestoornis. Patiënten met Clcr < 45 ml/min werden uitgesloten van deelname aan klinische onderzoeken. Patiënten met een nierfunctiestoornis dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd op bijwerkingen. Enkelvoudige doses Imnovid tot 50 mg bij gezonde vrijwilligers en eenmaal daagse, meervoudige doses van 10 mg bij patiënten met multipel myeloom zijn onderzocht en hebben niet geleid tot meldingen van ernstige bijwerkingen in verband met overdosering.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Opmerking hematoloog: Er is een grote studie gaande, waarin patiënten met matige of ernstige nierfunctiestoornissen ook deelnemen. Bij hen wordt de dosering pomalidomide niet gereduceerd. Vooralsnog heeft dat geen grote safety problemen gegeven.
- GIC: niet gevonden of de metabolieten actief of inactief zijn.
- PubMed search 29-7-2015: geen gegevens.

Clcr < 10 ml/min:

–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	-	16 februari 2016