Nierfunctie: tenofoviralafenamide 6626

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Vemlidy 10-3-2017	bij CrCl ≥ 15 ml/min of bij patiënten met CrCl < 15 ml/min die worden behandeld met hemodialyse, is dosisaanpassing niet nodig. Op hemodialysedagen na de dialyse toedienen. Dit advies is gebaseerd op zeer beperkte farmacokinetische gegevens en op het gebruik van modellen en simulatie. Gebruik wordt niet aanbevolen bij CrCl < 15 ml/min zonder hemodialyse. In studies werden tussen gezonde deelnemers en patiënten met CrCl 15-30 ml/min geen klinisch relevante verschillen in de farmacokinetiek van tenofoviralafenamide of tenofovir waargenomen. Renale excretie van intact tenofoviralafenamide is een onbelangrijke route waarbij < 1% van de dosis in de urine wordt uitgescheiden. Tenofoviralafenamide wordt hoofdzakelijk geëlimineerd na metabolisering tot tenofovir. Tenofovir wordt door de nieren geëlimineerd door zowel glomerulaire filtratie als actieve tubulaire secretie.

Risicogroep	

Opmerkingen:
–

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Nee	Nee	-	26 september 2017