

Nierfunctie: ropeginterferon alfa 2b

7423

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratiesnelheid

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC + EPAR Besremi Besremi 22-02-2021.	GFR < 89 ml/min: ongeacht de startdosering of de mate van verminderde nierfunctie moeten patiënten worden gecontroleerd. Als de nierfunctie afneemt tijdens de behandeling dient de behandeling te worden gestaakt. GFR 15-29 ml/min: startdosis 50 µg GFR < 15 ml/min: gecontraïndiceerd Een farmacokinetisch profiel bij verminderde nierfunctie is niet bepaald voor ropeginterferon alfa 2b. Dit is wel gedaan voor andere gepegyleerde alfa-interferonen.. <u>Peginterferon alfa 2b:</u> Matig verminderde nierfunctie: afname klaring met 17%; Ernstig verminderde nierfunctie: afname klaring met 44%; toev personen met een normale nierfunctie na 1 µg/kg 1x per week gedurende 4 weken. Cmax, AUC, en de halfwaardetijd waren toegenomen bij een verminderde nierfunctie toev personen met een normale nierfunctie na 1-malig peginterferon alfa-2b 1 µg/kg.

Risicogroep	
-------------	--

Opmerkingen:

- Pubmed search 28-07-2021: geen resultaten

	Wijziging kinetiek	Actie	Clcr grens	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Ja	30 ml/min	27 september 2021